

N.º 92

“STRESS” E VITAMINA C

As aves exploradas intensivamente estão muito sujeitas a factores de STRESS de várias origens, por exemplo: CALOR, PATOLOGIA, PRESSÃO DE PRODUÇÃO (carne ou ovos), VACINAÇÃO etc. Uma suplementação em Vitamina C é uma decisão óptima a dar nestas condições de STRESS.

É, no entanto, preciso levar em linha de conta que a suplementação em vitamina C deve ser iniciada antes de se atingir o máximo da situação de “stress”. Assim, para se conseguirem níveis adequados de vitamina C no plasma e para se obterem os melhores resultados, deve iniciar-se a administração de vitamina C tão cedo quanto possível nas situações de stress previsível, isto é, pelo menos 24 horas de antecedência.

De igual modo os níveis plasmáticos de vitamina C declinam rapidamente nas 24 horas após a cessação do fornecimento deste suplemento.

Assim, durante os períodos de stress deve fornecer-se Vitamina C CONTINUADAMENTE, quer através do alimento sólido quer da água de bebida.

Os melhores resultados obtêm-se quando se fornece Vitamina C nas seguintes quantidades:

- * Frangos de carne: 100 a 150g/Ton alimento
- * Reprodutoras pesadas: 150 a 200g/Ton alimento
- * Poedeiras: 100g/Ton alimento
- * Reprodutoras leves: 100g/Ton alimento

Pode também fornecer-se a Vitamina C através da água da bebida. Como base de cálculo deve fornecer-se 1g Vitamina C/litro de água durante o período de stress.

Aveiras de Cima, 25 de Maio de 1998
SERVIÇOS TÉCNICOS

NOTA IMPORTANTE: Aproxima-se a época do CALOR. Aconselhamos que se encare, com atenção, o que agora aconselhamos.

GV/CV

1/1