

N.º 124

AS COLITES

Frequentemente são denominadas “Colites”, os episódios de diarreia inespecífica em porcos de engorda, alimentados à vontade, e que apesar de não se traduzirem por mortalidade significativa, conduzem invariavelmente a atrasos de crescimento.

A ração poderá estar na chegada de grande quantidade de alimento à região pós-ileal (o íleo é a última porção do intestino delgado), que perturba o processo fermentativo, normalmente muito activo nessa zona. O criador mais atento depressa se apercebe da existência de dejeções com uma consistência mais branda, normalmente de cor cinza ou amarelada.

Causas prováveis:

- Incorporação elevada de trigo no alimento;
- Sobreaquecimento do granulado;
- Moenda demasiado fina;
- Valor baixo de fibra no alimento;
- Herança de um desmame com problemas.

Para resolver o problema, devemos:

1. Corrigir as causas alimentares (se presentes);
2. Incorporar enzimas no alimento, de modo a aumentar a sua digestibilidade;
3. Adicionar antibióticos, que ao controlarem o nível de fermentações, eliminam o problema.

(Adaptado de “Porc Magazine” , n.º 322 – Maio 1999)

Aveiras de Cima, 22 de Março de 2001
SERVIÇOS TÉCNICOS

GV/SN

1/ 1