

N.º 145

INFERTILIDADE SASONAL (SUÍNOS)

É uma situação que preocupa **todos** os suinicultores NAS ÉPOCAS DE CALOR e que se pode apresentar sob vários aspectos:

- Marrãs que entram mais tarde na puberdade
- Repetição deaios
- Cios “fracos”
- Período desmame / novo cio aumentado
- Cios mais curtos
- Mais leitões mumificados e nados mortos
- Surtos de abortos

AS CAUSAS são multifactoriais e todos os cientistas que se preocupam com a suinicultura têm escrito muito sobre o assunto.

COM O VERÃO A DECORRER, OS ERROS COMETIDOS AGORA ORIGINAM SEMPRE PROBLEMAS NO OUTONO.

Os efeitos podem ser insidiosos e graduais, estendendo-se por um PERÍODO DE DOIS MESES.

PONTOS CRÍTICOS

- **TEMPERATURAS ALTAS**, especialmente no caso dos machos, afectam o líbido dos varrascos e a qualidade do esperma durante **4 a 6 SEMANAS** após os ciclos de temperaturas altas.
- **AS PORCAS** sofrem muito com o calor, diminuindo o apetite principalmente durante o aleitamento. A baixa ingestão leva as porcas a um **balanço energético negativo** com impactos negativos na reprodução e provoca abortos.

- **MUDANÇA DO “PROGRAMA” DE LUZ**

Nas porcas exploradas em pavilhões, a luz deve estar **permanentemente** presente durante 16 horas/dia! É muito frequente as porcas estarem na obscuridade (em cerca de 66% das explorações!!)

- **“STRESS” NUTRICIONAL**

Deve acertar-se a composição do alimento para as épocas quentes. As marrãs e as gestantes devem ser alimentadas de madrugada.

Deve providenciar-se um sistema de “arrefecimento” para as porcas, por exemplo humedecendo-lhe o focinho.

- **INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL** inadequada

Aumentar em 15% as cobrições naturais ou fazer uma I.A. adicional no tempo quente.

Esta prática pode produzir MAIS DOIS LEITÕES POR NINHADA!

- **ERROS DE MANEIO**

Durante o tempo quente, se tiver porcas em grupo mantenha-as em pequenos grupos e evite “misturas”, movimente os animais com calma, principalmente os varrascos; preste atenção à ventilação e arrefeça as porcas prenhes e os varrascos com água, por exemplo.

- **COBRIÇÕES / IA**

Devem ser feitas de manhã muito cedo e ao fim do dia.

NOTA: As porcas exploradas ao ar livre sofrem ainda mais do problema de calor. Forneça-lhe SOMBRAS e BANHEIRAS em QUANTIDADE.

Aveiras de Cima, 13 de Agosto de 2002
SERVIÇOS TÉCNICOS

AL/LV