

N.º 58

UTILIZAÇÃO DO SULFATO DE AMINOSIDINA EM COELHOS

Trabalhos recentes realizados em Itália chamam-nos à atenção para os bons resultados na utilização do Sulfato de Aminosidina na prevenção e tratamento de afecções respiratórias e entéricas em coelhos. Segundo estes ensaios o produto mostrou ser bem tolerado e activo contra problemas de pasteurelose, salmonelose e colenterotoxémia, com boas percentagens de sucesso terapêutico comparativamente a outros produtos usualmente empregues na prática clínica desta espécie animal.

A apresentação do Sulfato de Aminosidina faz-se sob a forma injectável e formas orais, em pré-mistura medicamentosa (para incorporação no alimento) e pó solúvel (para administração na água de bebida). Dado que a sua absorção entérica é reduzida, as formas orais são de utilização exclusiva para tratamento de patologia do aparelho digestivo, enquanto que a via injectável é a via de eleição para o tratamento das afecções respiratórias.

DOSES DE UTILIZAÇÃO:

SULFATO DE AMINOSIDINA A 10% (SOLÚVEL)

2-4 g/litro de água de bebida durante 3 a 5 dias seguidos

SULFATO DE AMINOSIDINA A 10% (PRÉ-MISTURA)

4-8 kg/Ton de alimento composto durante 5 dias

SULFATO DE AMINOSIDINA (INJECTÁVEL)

0,1 mL/kg de peso vivo/dia (3 dias seguidos)

Este produto é comercializado no nosso país pela empresa VETEM, sob a designação de GABBROCOL.

Recomenda-se a consulta dos serviços técnicos desta empresa para mais informações.

NOTA: Sugere-se aos nossos clientes de fábricas de rações a divulgação desta informação junto dos seus clientes cunicultores.

Aveiras de Cima, 03 de Janeiro de 1996
SERVIÇOS TÉCNICOS

SN/GV

2/ 2