TECNOLOGIA E NUTRIÇÃO ANIMAL, LDA

Tecnologia Qualidade Rigor

Informação Técnica



Nº 50

GALINHAS POEDEIRAS - MANEIO E PRODUÇÃO

A chave para obter bons resultados está no cumprimento das recomendações da granja que forneceu as pintas ou as frangas. Os programas alimentares e de maneio devem ser ajustados no sentido de alcançar todos os parâmetros recomendados.

O peso tem sido o parâmetro de maior importância em análise, para uma correcta apreciação de um bando em pré-postura. Dados recentes afirmam que além do peso, um dos indicadores da evolução dos bandos até 7-9 semanas de vida é o comprimento da canela (comprimento da tíbia). A partir dos valores encontrados é possível ajustar o programa alimentar, pois verificou-se que discrepâncias neste parâmetro têm relação no futuro com a qualidade da casca do ovo e a percentagem de prolapsos.

Aproximadamente 85% do comprimento da tíbia deve ser alcançado às 8 semanas de idade.

Após esta fase é já o peso corporal o parâmetro a ter mais em consideração para apreciação da evolução do bando.

ASPECTOS NUTRICIONAIS

Recomenda-se a utilização de 4 tipos de alimentos:

* Pré-starter
* Starter
* Crescimento
* Alimento de pico

Cada uma das dietas, em termos nutricionais, deve estar de acordo com as recomendações da empresa fornecedora das pintas.

Nesta fase, o ponto mais importante é o momento apropriado para a transição do "Starter" para o "Crescimento". Deve ser feita quando o objectivo comprimento de canela às 8 semanas é atingido, o que pode não coincidir exactamente com essa idade.

Um alimento pré-postura é desaconselhado pois pode provocar uma entrada em produção muito precoce, com todos os problemas que lhe são inerentes.

Apartado 8 - 2050 Aveiras de Cima . Tel. (063) 47 61 01 . Fax (063) 47 62 54
E-mail:tecnutre@mail.telepac.pt

CÁLCIO E FÓSFORO

O factor mais importante a considerar no alimento de poedeiras em produção é o fornecimento de 50% do cálcio alimentar sob a forma granulada (granulos de 2-4 mm), mais disponível para absorção.

PROGRAMAS DE LUZ

Os programas de luz são de extrema importância e podem ser manipulados de modo a ajustar a idade da maturidade sexual. Para que seja possível tirar o maior rendimento do potencial genético das galinhas, é necessário seguir de um modo rigoroso as recomendações da granja fornecedora das aves.

CORTE DE BICOS

O corte dos bicos é uma medida eficaz na redução do canibalismo nas aves adultas.

O consumo de ração assim como o peso corporal têm tendência a diminuir a seguir a esta operação, atingindo maiores proporções, quanto mais tarde é efectuada.

A idade ideal situa-se entre os 6 e os 9 dias.

Para poedeiras no solo pode proceder-se a um segundo corte entre as 6 e as 9 semanas. Nos dois dias anteriores e nos três dias posteriores ao corte dos bicos, as aves devem receber um suplemento de vitamina K na água de bebida.

DENSIDADE

Neste campo, as recomendações da granja fornecedora devem igualmente ser seguidas.

TEMPERATURA

Uma temperatura altas no interior do pavilhão é de grande responsabilidade num eventual insucesso do bando.

Tem efeitos no peso corporal por redução do consumo de ração e consequentemente nas performances produtivas. Em períodos de calor devem ser tomadas medidas para estimular o consumo.

CONCLUSÃO

Não vale a pena improvisar, ou inventar o que já foi inventado.

Para atingir boas performances só há um segredo:
- Cumprir com as recomendações e programas de maneio da empresa que forneceu as aves.

"*In FEEDSTUFFS, June 5, 1995*"

Aveiras de Cima, 03 de Julho de 1995

SERVIÇOS TÉCNICOS

LF/SN