



**TECNOLOGIA E NUTRIÇÃO
ANIMAL, LDA**



Tecnologia Qualidade Rigor
Informação Técnica



Nº 96

REGRAS PARA O MANEIO DE PINTOS DO DIA (2ª PARTE)

Temperatura

A temperatura corporal de um frango adulto é de cerca de 41°C, enquanto que nos pintos do dia, este valor não excede os 39,5°C. Esta diferença deve-se ao desenvolvimento ainda deficiente do sistema termoregulador nas aves muito jovens, que não possuem a capacidade de regular a sua própria temperatura de um modo eficaz. Por outro lado, apresentam graus de sensibilidade diferentes em relação às variações térmicas, mas em situações extremas conseguem resistir melhor às temperaturas baixas do que às excessivamente altas (perigo de desidratação).

É relativamente fácil saber se os pintos estão num ambiente agradável, apenas por uma observação atenta:

- Se estão bem, evoluem nos seus parques ao longo do espaço que têm disponível, ocupando-o na totalidade;
- Se sentirem frio, juntam-se por baixo da fonte de calor;
- Se estiver muito quente, evitam a zona de maior reflexão da fonte de calor;
- Se estiverem pequenos grupos concentrados em vários locais, significa que existem correntes de ar.

Os pintos quando sofrem de calor ou frio têm tendência para ficar imóveis, não comem nem bebem e acabam por morrer. A temperatura óptima para os pintos à chegada é de cerca de 32-33°C, que deve diminuir gradualmente até aos 21 dias.

Este é um dos casos em que a atenção e a sensibilidade do observador substitui com vantagem o melhor aparelho de medida.

Adaptado de: "World Poultry"
Vol.13, Nº10, 1997

Aveiras de Cima, 25 de Agosto de 1998

SERVIÇOS TÉCNICOS

GV/SN

1/1